



Acer xfreemanii 'Armstrong'



Hoogte	10 - 15 m
Breedte	4-6m
Kroon	zuilvormig, dichte kroon
Schors en takken	geen bijzonderheden
Blad	3/5-lobbig, groen, 10 - 20 cm
Herfstkleur	oranje, rood
Bloemen	bloemtuilen, rood, maart/april
Vruchten	geen, vruchtloze cultivar
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	niet te kalkrijk
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	4 (-34,4 tot -28,9 °C)
Windbestendigheid	zeer goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	lanen en brede straten, smalle straten
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Synoniemen	Acer rubrum 'Armstrong'

Acer xfreemanii 'Armstrong' cultivar is in 1951 in de Verenigde Staten ontstaan en werd tot voor kort tot A. rubrum gerekend. Uit recente studies is gebleken dat 'Armstrong' ontstond uit een kruising tussen A. rubrum en A. saccharinum en daarom tot de hybride Acer x freemanii behoort. Deze hybride is niet alleen door menselijk toedoen ontstaan, maar komt ook in het wild in de Verenigde Staten voor. De bladeren zijn drie- tot vijflobbig en groen. De onderzijde is grijsgroen. In ons land is de prachtige orangerode herfstkleur alleen na warme zomers te zien. Is breed wortelend met een fijne vertakking. 'Armstrong' verlangt een bodem die niet te kalkrijk is. De boom kan goed in verharding gebruikt worden, wat hem uitermate geschikt maakt voor toepassing in smalle straten en lanen.