

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 09:17
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@witteveenbos.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: Geitenhouderij en opvanglocatie asielzoekers Dalfsen
Bijlage(n): Grafische presentatie van de onderzoeksresultaten van VGO UGO over het risico op longontsteking binnen 2 km van een geitenhouderij.docx

Hoi [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED],

Hieronder (nogmaals) het advies van de GGD over de geitenhouderij.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider Opvanglocaties

E-mail: [REDACTED]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@ggdijsseiland.nl>
Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 14:25
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: RE: Geitenhouderij en opvanglocatie asielzoekers Dalfsen

Hoi [REDACTED],

Prima, bij deze nog even de gezondheidsrisico's op een rij, in aanvulling op het eerder gegeven advies van mijn collega, dat ook nog steeds geldt:

- Het VGO-onderzoek laat een verband zien tussen het risico op longontsteking bij omwonenden en de afstand tot een geitenhouderij. GGD'en adviseren daarom uit voorzorg 2 kilometer afstand aan te houden tussen een geitenhouderij en een gevoelige bestemming (waaronder kinderopvang).
- Zonder invloed van veehouderij is het risico op longontsteking ongeveer 1,4% per persoon per jaar (1400 gevallen per 100.000 inwoners). Bij een geitenhouderij neemt dit risico toe naarmate men dichterbij het bedrijf woont. Op een afstand van 500 meter is het risico op longontsteking 70% hoger dan de baseline (1,4 %). De bijlage geeft een grafische weergave hiervan. Daaruit is tevens af te leiden dat het extra risico op longontsteking vanaf 500 m tot de geitenhouderij snel afneemt. De GGD kan geen risico's per meter afstand voorspellen.
- Longontsteking is extra risicovol voor kinderen (tot 4 jaar), senioren van >70 jaar en mensen met een zwakke gezondheid.

Het strikt doorvoeren van de afstandsadviezen zou grote delen van het buitengebied in Nederland op slot zetten. Aan gezien de opvanglocatie op ongeveer 1 km van de geitenhouderij komt te liggen en het extra risico op longontsteking vanaf 500 meter snel afneemt (tussen de 1 en 2 km is de toename van het risico beperkt), heeft de GGD geen grote bezwaren tegen deze ontwikkeling.

Kan je hier zo verder mee?

Hartelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Milieu en Gezondheid en [REDACTED]
GGD IJsselland en GGD Twente

T: 06 [REDACTED]
E: [REDACTED]@ggdijsseiland.nl
Werkdagen: [REDACTED]



GGD Twente is onderdeel van Samen Twente.

Van: [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>

Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 13:35

Aan: [redacted] <[redacted]@ggdijsselland.nl>

Onderwerp: RE: Geitenhouderij en opvanglocatie asielzoekers Dalfsen

Hoi [redacted],

Bedankt voor het heldere telefoongesprek net.

Zou je ook nog het besproken advies op papier kunnen zetten? Dan kunnen we die gebruiken ook in communicatie richting omgeving en bestuur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider Opvanglocaties

E-mail: [redacted]@dalfsen.nl

Web: www.dalfsen.nl



Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 11:32

Aan: [redacted]@ggdijsselland.nl

Onderwerp: Geitenhouderij en opvanglocatie asielzoekers Dalfsen

Urgentie: Hoog

Beste [redacted],

Gemeente Dalfsen is samen met het COA bezig met de planvorming voor een opvanglocatie voor 190 asielzoekers in Dalfsen.

Deze komt circa 1 kilometer van een geitenhouderij (Kreuleweg 3) te liggen. Hier heeft de GGD al eerder advies over gegeven mbt de woningbouwontwikkelingen in Het Engelland.

Toen was de conclusie (zie bijlage voor gehele advies):

Conclusies en advies

Uitsluitend op basis van de gezondheidkundige effecten van de geitenhouderij heeft de GGD voor de invulling van de woonbehoefte de volgende voorkeursvolgorde: eerst Oost, dan West en daarna Noord. Daarnaast geldt het volgende advies:

- Zolang de oorzaak van het extra risico op longontsteking door geitenhouderij niet bekend is, zou binnen de plangebieden West en Noord een fasering in tijd en zonering in ruimte toegepast kunnen worden voor (extra) gevoelige bestemmingen. Dat betekent dat binnen een plangebied begonnen wordt met de bouw van woningen zover mogelijk van de geitenhouderij vandaan. Mocht dan in verloop van tijd bekend worden wat de oorzaak van het extra risico op longontsteking is, dan kan door gerichte (bron)maatregelen dit probleem mogelijk verminderd of opgeheven worden.
- Daarnaast geldt het advies om, hangende het eerder genoemde onderzoek, seniorenhuisvesting, zorgcomplexen en kinderopvanglocaties binnen een plangebied zover mogelijk, en tenminste 250 m, van de geitenhouderij te plaatsen.

COA heeft een concept inrichtingsschets gemaakt, waarbij de school binnen 1 kilometer komt te liggen van de geitenhouderij.

De opvang is voor 190 asielzoekers, dus ze verblijven hier tijdelijk (totdat er een beoordeling is geweest over hun verblijfstatus en ze terugkeren of doorstromen naar een andere locatie).

De opvanglocatie zelf blijft minimaal 5 en maximaal 10 jaar op het Engelland staan, dit hangt af van de snelheid van de woningbouwontwikkeling.

Is het advies van jullie nog steeds hetzelfde als bij de woningbouwontwikkelingen? Of ligt dit anders bij tijdelijke bewoning zoals een AZC?

Ik begrijp als je nav deze mail nog vragen hebt, zou je vandaag of later deze week even via Teams kunnen overleggen?

Met vriendelijke groet,


 J

Projectleider Opvanglocaties

E-mail: @dalfsen.nl

Web: www.dalfsen.nl


gemeente Dalfsen 




Grafische presentatie van de onderzoeksresultaten van VGO UGO over het risico op longontsteking binnen 2 km van een geitenhouderij

Opmerking: Het exacte verloop van het aantal gevallen van longontsteking binnen de 2 km zone **is niet bekend. Deze presentatie leent zich daarom niet voor curve fitting!** Uit de meta-analyse van VGO UGO blijkt dat het aantal gevallen van longontsteking toeneemt als de afstand tot de geitenhouderij kleiner wordt. Zonder veehouderij is het aantal gevallen van longontsteking circa 1400 per 100.000 inwoners per jaar (getrokken lijn). Op 1000 m vanaf een geitenhouderij is het aantal gevallen van longontsteking 20% hoger en op 500 m 70% hoger dan de baseline van 1400 gevallen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking en acute bronchi(oli)tis 2018



Aantal opnamen per 1.000 inwoners



Bron: [Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg](#) (gedownload van CBS StatLine in april 2020)

- ICD-10-codes: A48.1, J12-J18, J69.0 (longontsteking) en J20-J22 (acute bronchi(oli)tis)
- Cijfers zijn voorlopig

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen