



Rapport

Soortgericht Onderzoek

Wethouder Teselinglaan 42, Driebergen-Rijsenburg

In het kader van de Omgevingswet

COLOFON

Titel	: Soortgericht Onderzoek Wethouder Teselinglaan 42
Kenmerk	: PRPOA25-00242
Versie	: Versie 1
Datum rapport	: 13-10-2025
Aantal pagina's	: 9 excl. Bijlage
Projectleider	: [REDACTED]
Auteur(s)	: [REDACTED]
Inspectiewerk	: [REDACTED]
Kwaliteitscontrole	: [REDACTED]
Wijze van citeren	: Schriekenberg, T. (2025) Soortgericht Onderzoek Wethouder Teselinglaan 42, Pius Floris Onderzoek & Advies
Opdrachtgever	: [REDACTED]



Pius Floris Onderzoek en Advies

Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Postbus 75103
1070 AC Amsterdam
T: +31 (0)73 - 6567235
pfoa@piusfloris.nl
www.piusfloris.nl

Contactpersoon:

M: [REDACTED]
E: [REDACTED]@piusfloris.nl

INHOUD

2. INLEIDING	3
2.1. AANLEIDING	3
2.2. DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN	3
2.3. PLANGEBIED	3
2.4. BEOOGDE ONTWIKKELING	4
2.5. OMGEVINGSWET TRAJECT	4
2.6. LEESWIJZER	4
3. ECOLOGIE.....	5
3.1. GEWONE DWERGVLEERMUIS.....	5
3.2. KLEINE DWERGVLEERMUIS	5
3.3. RUIGE DWERGVLEERMUIS.....	5
3.4. LAATVLIAGER	5
3.5. HUISMUS	6
3.6. SPREEUW	6
4. METHODE	7
4.1. VLEERMUIZEN	7
5. RESULTATEN EN EFFECTBEOORDELING	9
5.1. RESULTATEN VELDWERK VLEERMUIZEN	9
5.1.1. Verblijfplaatsen	9
5.1.2. Foerageergebied	9
5.1.3. Vliegroutes	9
5.1.4. Effectbeoordeling Vleermuizen.....	9
6. CONCLUSIE EN ADVIES	10
6.1. HOOFDCONCLUSIES.....	10
BIBLIOGRAFIE	11
7. BIJLAGE I: TOETSINGSKADER SOORTENBESCHERMING.....	12
SPECIFIEKE ZORGPLICHT	12
BESCHERMINGSREGIMES.....	12
SCHADELIJKE HANDELINGEN EN VERGUNNINGSPLICHT	12

1. INLEIDING

1.1. AANLEIDING

is voornemens het huidige pand op het kavel aan de Wethouder Teselinglaan 42 te slopen en te herbouwen. Vanuit nationale en Europese regelgeving bestaat de verplichting om onderzoek te doen naar de effecten op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN)) alvorens de ontwikkeling te realiseren. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is in 2025 door Pius Floris Onderzoek en Advies een flora en fauna quickscan uitgevoerd (kenmerk: 25Q0392). De flora en fauna quickscan gaf aanleiding tot soortgericht onderzoek naar zomer- en/of paarverblijven van gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*), ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*), kleine dwergvleermuis (*Pipistrellus pygmaeus*), en laatvlieger (*Eptesicus serotinus*). Daarnaast is er onderzoek gedaan naar rust- en voortplantingsplaatsen van spreeuw (*Sturnis Vulgaris*) en huismus (*Passer domesticus*). Effecten op overige verblijfplaatsen van vleermuizen (kraam en (massa)winter) en andere beschermde soorten zijn uitgesloten op basis van de flora en fauna quickscan. Gezien de periode die nodig is voor het onderzoeken van zomer- en paarverblijven deels samenvalt met die van kraam- en winterverblijfplaatsen worden de laatste twee typen verblijfplaatsen ook meegenomen in dit onderzoek. Waar nodig worden de tijden hierop aangepast.

1.2. DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN


In het voorliggende rapport worden de resultaten van het soortgericht onderzoek, een conclusie met betrekking tot de aanwezigheid van de soort, het terreingebruik en de eventuele noodzaak voor mitigatie/compensatie en/of omgevingsvergunning beschreven. Dit rapport geldt als basis voor nadere procedures in het kader van een eventuele vergunningverlening.

De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing:

- Komen gebouwbewonende vleermuizen voor in het plangebied?
 - o Welke vleermuissoorten komen voor in het plangebied?
 - o Zijn er zomer- en/of paarverblijven aanwezig binnen het plangebied?
 - o Zijn er essentiële vliegroutes en/of foerageergebieden aanwezig binnen het plangebied?
 - o Zijn er rust- en/of voortplantingsplaatsen van huismus?
 - o Zijn er voortplantingsplaatsen van spreeuw?

1.3. PLANGEBIED

Het plangebied is gelegen aan de Wethouder Teselinglaan 42 in Driebergen-Rijsenburg (Afbeelding 1). Het plangebied bestaat uit een stenen gebouw. Het gebouw heeft één verdieping met daarop een vliering. Het gebouw heeft geen spouwmuur. Het dak bestaat uit dakpannen en is afgewerkt met houten boeidelen.



Afbeelding: Ligging planlocatie

1.4. BEOOGDE ONTWIKKELING

De voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop en herbouw van het pand. In dit kader gaat het soortgericht onderzoek enkel in op de te verwachten effecten van de werkzaamheden op wettelijk beschermde natuurwaarden in het gebouw.

1.5. OMGEVINGSWET TRAJECT

De Omgevingswet (Ow) gaat uit van een “ja-mits principe”, hierbij geldt dat activiteiten doorgang mogen vinden wanneer er tijdens de activiteiten bepaalde regels aangehouden worden. Daarnaast is het verboden om voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. De Ow beschermt niet alleen de soort maar ook individuen. In dit kader dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden en/of een vergunning aangevraagd te worden wanneer de ontwikkeling één en/of meerdere individuen van een beschermde soort schaadt.

Eventuele benodigde mitigerende maatregelen dienen uitgewerkt te worden in een mitigatieplan, dit mitigatieplan volgt uit het soortgericht onderzoek en dient als basis voor een vergunningaanvraag. Mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om de functionaliteit van het gebied en de gunstige staat van instandhouding van de soort te waarborgen. Wanneer mitigerende maatregelen voldoende worden geacht, wordt door het bevoegd gezag een vergunning verleend. Hieraan kunnen door het bevoegd gezag aanvullend specifieke voorschriften gesteld worden.

1.6. LEESWIJZER

In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de ecologie van de onderzochte diersoorten en/of soortgroepen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de gebruikte onderzoeksmethodes en de uitgevoerde veldbezoeken. In hoofdstuk 5 worden per onderzochte soort of soortgroep de veldresultaten behandeld van het soortgericht onderzoek. Tevens wordt hier de effectbeoordeling van de voorgenomen ingreep op de soort behandeld. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies behandeld en soortgebonden adviezen gegeven en vervolgstappen beschreven. Bijlage I beschrijft het wettelijke toetsingskader, de geldende beschermingsregimes en wettelijke bepalingen.

2. ECOLOGIE

2.1. GEWONE DWERGVLEERMUIS

Gewone dwergvleermuizen jagen in gesloten tot halfopen landschap. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. Ze vangen een breed spectrum aan veelal kleinere prooien uit de lucht en pakken dat wat voorhanden is. Ze eten voornamelijk muggen, dansmuggen, schietmotten, maar ook haften, gaasvliegen, nachtvinders en soms ook kevers.

Gewone dwergvleermuizen zijn plaatstrouw, maar gebruiken meerdere zomer- en/of paarverblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. In de bebouwde kom zijn de baltsvluchten van roepende mannetjes in hun territorium in de herfst gemakkelijk op te sporen. De paarverblijven in spleten en om gebouwen zijn echter moeilijk te vinden. Vaak liggen er in een stad of dorp veel territoria in één bepaalde wijk.

2.2. KLEINE DWERGVLEERMUIS

Over het specifieke jachtgedrag van de kleine dwergvleermuis in Nederland is relatief weinig bekend, vanuit het buitenland wordt de kleine dwergvleermuis veelal foeragerend aangetroffen in waterrijke gebieden zoals riviergebieden, moerasgebieden en vochtige bossen. De jachtvlucht lijkt sterk op de vlucht van de gewone dwergvleermuis.

De kleine dwergvleermuis is een zeer zeldzame soort in Nederland maar kan door het gehele land worden waargenomen. Zomerverblijfplaatsen worden hoofdzakelijk aangetroffen in spleetvormige ruimten in gebouwen, zoals de spouw, in daklagen of achter gevelbetimmering. Paarverblijfplaatsen bevinden zich zowel in bomen als gebouwen en sporadisch in vleermuiskasten. In de winter worden kleine dwergvleermuizen aangetroffen in spleetvormige ruimten in bovengrondse gebouwen en in bomen, vaak op weinig beschutte plekken.

2.3. RUIGE DWERGVLEERMUIS

Ruige dwergvleermuizen foerageren hoofdzakelijk in halfopen water- en bosrijke gebieden. Ze jagen in snelle rechtlijnige vluchten met lange banen. De jachtvluchten vinden over het algemeen op een hoogte van 2 tot 5 m plaats, op enige afstand van begroeiing of boven waterpartijen. Ruige dwergvleermuizen jagen doorgaans op donkere plekken tot circa 10 km van de verblijfplaats, al wordt er ook onder straatlantaarns gefoerageerd. Het dieet van de ruige dwergvleermuis bestaat uitsluitend uit vliegende insecten en wordt hoofdzakelijk door dansmuggen opgemaakt. Onder andere met gaasvliegen en snaveldragers wordt het dieet aangevuld.

Ze gebruiken meerdere verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. Roepende territoriale mannetjes en paarverblijven zijn gevonden in nest- en vleermuiskasten, in boomholtes en achter daklijsten en betimmeringen. De balts vindt plaats vanuit de verblijfplaats, zeer sporadisch vliegend. Vaak liggen er veel paarplaatsen of – territoria in een klein gebied bijeen. Oude gatenrijke loofbossen in de omgeving van waterpartijen kunnen tot echte ruige dwergvleermuis-paargebieden worden gerekend, waar haast in elke boom een mannetje zit te roepen.

2.4. LAATVLIAGER

De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. Bij windstil weer wordt het open gebied belangrijker. Soms jagen ze in groepjes. Laatvliegers vangen insecten hoofdzakelijk uit de lucht, maar pakken soms ook prooien van bladeren of van de grond. Ze vangen voornamelijk grotere soorten nachtvinders, kevers en muggen.

Solitaire laatvliegers (vaak mannetjes) worden sporadisch achter vensterluiken gevonden. Er is verder echter nog maar weinig bekend over verblijfplaatsen van laatvlieger. Deze worden vaak gevonden onder dakpandaken, met een ogenschijnlijke voorkeur voor kopgevels. In de paartijd (september-oktober) worden vergelijkbare verblijven gebruikt. Laatvliegers bewonen een netwerk van verschillende huizen die op een afstand van hooguit enkele honderden meters van elkaar liggen. Ze verhuizen soms wel, maar zijn in principe erg plaats- en gebiedstrouw.

2.5. HUISMUS (*PASSER DOMESTICUS*)

De huismus is een algemene broedvogel in stedelijk gebied, huismussen zijn sterk gebonden aan menselijke bebouwing voor de nestlocaties. Doorgaans broeden huismussen in een los kolonie verband, hierbij worden nestplaatsen gezocht onder dakpannen, in gaten en stootvoegen van gebouwen, tussen raamkozijnen en zelfs in rolluiken. Daarnaast wordt graag gebruik gemaakt van nestkasten. Aan de (functionele) leefomgeving stelt de huismus vrij hoge eisen, nestlocaties moeten voldoen aan een combinatie van een aantal essentiële elementen. Op korte afstand (maximaal enkele honderden meters) van de nestlocatie moeten voldoende voedselbronnen aanwezig zijn. Er moet voldoende dekking aanwezig zijn, in de vorm van doornige struiken, groenblijvende struiken en/of klimplanten. Ook zijn locaties noodzakelijk waar stofbaden kunnen worden genoten en waar drinkwater te vinden is. Bij het ontbreken van één van deze factoren of wanneer de afstanden te groot worden kan het habitat ongeschikt raken.

2.6. SPREEUW (*STURNUS VULGARIS*)

Spreeuwen zijn één van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. De vogel broedt van half april tot in juni. Heeft één, soms twee legsels met gewoonlijk 4-6 eieren. De broedduur is 11-13 dagen. De spreeuw is geen koloniebroeder, maar broedt wel graag met meerdere soortgenoten bij elkaar in de buurt. De jongen zitten 19-24 dagen in het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog zo'n 4-5 dagen gevoerd. Spreeuwen broeden in holtes van bomen, in nestkasten en in gaten en kieren van gebouwen. Spreeuwen zijn opportunisten en je komt ze dan ook op veel plaatsen in ons land tegen, ook in dorpen en steden (bijvoorbeeld op stations). De spreeuw is een echte graslandvogel. Grasvelden (van vochtig tot droog) en in veel mindere mate akkers voorzien spreeuwen van insecten en hun larven.

3. METHODE

3.1. VLEERMUIZEN

Het vleermuisonderzoek naar gebouwgebonden vleermuizen heeft plaatsgevonden in de periode 15 mei t/m 9 september 2025. Naast het plangebied is tevens de directe omgeving geïnventariseerd. Het veldwerk is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 2021 geactualiseerd voor meervleermuis, zoals opgesteld door Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2025). Tijdens het vleermuisonderzoek is de aanwezigheid van vleermuizen en verblijfplaatsen vastgesteld op basis van zicht- en geluidswaarnemingen.

De geluidswaarnemingen werden met behulp van een batdetector van het type Wildlife Acoustics Echo Meter Touch 2 Pro en een Petterson D100 verkregen. Hiermee kunnen de ultrasone geluiden van een vleermuis worden opgevangen en worden omgezet naar, voor mensen, hoorbare geluiden. Met een batdetector kan op basis van (piek)frequentie, klank en ritme in veel gevallen de soort worden gedetermineerd. Naast geluidswaarnemingen biedt de Echo Meter Touch 2 Pro de mogelijkheid om in het veld het sonogram, oscillogram en spectrogram te bekijken, waardoor pulsafstanden en pulsvormen meegenomen kunnen worden in de determinatie. Wanneer determinatie in het veld niet met zekerheid mogelijk was zijn de opnames met BatExplorer (Elekon, versie 2.1.9.1) geanalyseerd.

Gedurende het vleermuis onderzoek zijn vijf gerichte veldbezoeken uitgevoerd, daarbij waren twee ecologen voldoende om de gevel van het gebouw te kunnen overzien. De veldbezoeken zijn uitgevoerd in de periode 15 mei t/m 15 september en hebben betrekking op zomer- en paarverblijfplaatsen (Tabel 1). Gezien de periode van het onderzoek is er ook gekeken naar kraam- en individuele winterverblijven, ondanks dat deze eerder in de Flora en Fauna Quicksan zijn uitgesloten.

Voor soortgericht vleermuisonderzoek moeten de weersomstandigheden geschikt zijn om voldoende activiteit waar te nemen. Het veldwerk is uitgevoerd conform de minimale eisen zoals opgesteld door Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2025). Tabel 2 geeft de weersomstandigheden per veldbezoek weer.

Tabel 1: Kenmerken veldbezoek ten behoeve van vleermuisonderzoeken.

DATUM VELDBEZOEK	TIJDSTIP	ONDERZOEKSDOEL	ONDERZOCHE SOORT	HOEVEELHEID ONDERZOEKERS	ONDERZOCHE LOCATIES
17-05-2025	21:15-00:20	Zomer- en kraamverblijfplaats, vliegroutes en foerageergebied	Gewone- kleine, en ruige dwergvleermuis, laatvlieger,	2	Rondom gebouw
02-07-2025	01:34-05:34	Zomer- en kraamverblijfplaats	Gewone- kleine, en ruige dwergvleermuis, laatvlieger,	2	Rondom gebouw
15-07-2025	21:00-00:30	Zomer- en kraamverblijfplaats	Gewone- kleine, en ruige dwergvleermuis, laatvlieger,	2	Rondom gebouw
18-08-2025	21:00-00:30	Paarverblijfplaats, vliegroutes en foerageergebied	Gewone- kleine, en ruige dwergvleermuis, laatvlieger,	2	Rondom gebouw
09-09-2025	20:15-23:15	Paarverblijfplaats	Gewone- kleine, en ruige dwergvleermuis, laatvlieger,	2	Rondom gebouw

Tabel 2: Weersomstandigheden veldbezoek ten behoeve van vleermuisonderzoeken.

DATUM VELDBEZOEK	TEMPERATUUR	WIND	BEWOLKING	NEERSLAG
18-06-2025	21 °C	ZW 2 Bft	Geen bewolking	Droog
09-07-2025	16 °C	ZW 2 Bft	Licht bewolkt	Droog
10-07-2025	17 °C	ZW 2 Bft	Licht bewolkt	Droog
18-08-2025	20 °C	N 1 Bft	Geen bewolking	Droog
09-09-2025	14 °C	Z 1 Bft	Licht bewolkt	Droog

3.2. HUISMUS EN SPREEUW

Aangezien spreeuw doorgaans gebruik maakt van vergelijkbare nestlocaties als huismus is het onderzoek naar beide soorten simultaan uitgevoerd. Het soortgericht onderzoek naar huismus en spreeuw is uitgevoerd conform de methode voorgeschreven in het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2023). Voor het moment van onderzoeken is de methode uit het soorteninventarisatieprotocol van Netwerk Groene Bureaus gehanteerd (Netwerk Groene Bureaus, 2021). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 1 april t/m 15 mei. In deze periode zijn er twee veldbezoeken uitgevoerd met intervallen van minimaal 10 dagen. De onderzoeken zijn minstens twee uur na zonsopkomst uitgevoerd en duurden minimaal twee uur. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd met één ecoloog. De onderzoeken hebben plaatsgevonden onder goede weersomstandigheden: geen regen, geen harde wind (≤ 4 Bft) en voldoende warm. De data van de veldbezoeken, het onderzoeksdoel en de respectievelijke weersomstandigheden zijn te vinden in tabel 3.

Tabel 3. Weersomstandigheden veldbezoek ten behoeve van huismus en spreeuw.

DATUM VELDBEZOEK	TEMPERATUUR	WIND	BEWOLKING	NEERSLAG
17-04-2025 09.00-11.00	14 °C	ZW 1 Bft	Licht bewolkt	Droog
04-05-2025 09.00-11.15	13 °C	ZW 2 Bft	Licht bewolkt	Droog

4. RESULTATEN EN EFFECTBEOORDELING

4.1. RESULTATEN VELDWERK VLEERMUIZEN

4.1.1. VERBLIJFPLAATSEN

In de zomer- en kraamperiode zijn tijdens het ochtendbezoek geen invliegende vleermuizen in het dak of gebouw waargenomen, ook zijn er tijdens de avondbezoeken geen uitvliegende vleermuizen aangetroffen. In geen van de onderzoeksrondes zijn vleermuizen waargenomen die enige binding tot het gebouw lieten zien. De aanwezigheid van zomer- en kraamverblijfplaatsen in het gebouw zijn uitgesloten.

Bij de veldbezoeken tijdens de paarperiode zijn geen sociale geluiden of baltsende vleermuizen waargenomen in de omgeving van de betreffende bebouwing. De aanwezigheid van paarverblijfplaatsen in en rondom het gebouw zijn uitgesloten. Tijdens de veldbezoeken in deze periode is ook gekeken naar de aanwezigheid van winterverblijven. Deze zijn niet aangetroffen. De aanwezigheid van winterverblijven is derhalve uitgesloten.

4.1.2. FOERAGEERGEBIED

Rondom het gebouw werd tijdens de veldbezoeken beperkt (maximaal twee individuen op één moment) gevoerageerd door gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis. Op basis hiervan is aanwezigheid van essentiële foerageergebieden in het plangebied en de directe omgeving uitgesloten.

4.1.3. Vliegroutes

In het plangebied en de directe omgeving is geen vliegroute vastgesteld. Derhalve zijn nadelige gevolgen van de sloop en herbouw van het pand voor deze functie uitgesloten.

4.1.4. EFFECTBEOORDELING VLEERMUIZEN

Er zijn geen zomer-, kraam-, paar- of winterverblijven van gewone -, ruige - of kleine dwergvleermuis of laatvlieger vastgesteld in het gebouw. De werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. De bebouwing maakt geen onderdeel uit van essentieel foerageergebied of essentiële vliegroute. De werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen op essentieel foerageergebied of essentiële vliegroutes van vleermuizen.

4.2. RESULTATEN VELDWERK HUISMUS, SPREEUW

4.2.1. EFFECTENBEOORDELING

Tijdens de veldbezoeken is geen activiteit van huismus en/of spreeuw waargenomen binnen het plangebied en in de omgeving ervan. Aanwezigheid van nesten van huismus en/of spreeuw binnen het plangebied is uitgesloten, nadelige gevolgen van de werkzaamheden zijn uitgesloten.

5. CONCLUSIE EN ADVIES

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 6.1 de belangrijkste conclusies uit het onderzoek beschreven. Voor elke soortgroep waarvoor dit relevant is wordt een advies gegeven over de te nemen vervolgstappen.

5.1. HOOFDCONCLUSIES

- Het onderzoek heeft geen aanwezigheid van zomer-, kraam-, paar-, en/of winterverblijven van gewone-, kleine- en ruige dwergvleermuis en laatvlieger vastgesteld.
- Uit het onderzoek blijkt dat er geen essentiële foerageergebieden of vliegroutes van vleermuizen aanwezig zijn in het plangebied en de directe omgeving.
- Uit het onderzoek blijkt dat er geen vaste rust- en/of voortplantingsplaatsen zijn van huismus.
- Uit het onderzoek blijkt dat er geen voortplantingsplaatsen zijn van spreeuw.

5.2. VERVOLGSTAPPEN

Op basis van het onderzoek zijn nadelige gevolgen op de onderzochte soorten en gebiedsfuncties uitgesloten. Verdere vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. De werkzaamheden kunnen doorgang vinden zoals gepland.

BIBLIOGRAFIE

BIJ12. (2024, April). Kennisdocument Gewone dwergvleermuis. BIJ12. Van <https://www.bij12.nl/kennisdocumenten/gewone-dwerg>

BIJ12. (2024, September). Kennisdocument Ruige dwergvleermuis. BIJ12. Van <https://www.bij12.nl/kennisdocumenten/ruige-dwergvleermuis>

BIJ12. (2025, Augustus). Kennisdocument Laatvlieger. BIJ12. Van <https://www.bij12.nl/kennisdocumenten/kennisdocument-laatvlieger/>

Netwerk Groene Bureaus. (2023, November). Soortinventarisatieprotocollen. Van <https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/soortinventarisatieprotocollen>

Netwerk Groene Bureaus. (2025, Maart). Vleermuisprotocol 2021. Van <https://www.netwerkgroenebureaus.nl/vleermuisprotocol-2021-geactualiseerd-voor-meervleermuis>

SOVON. (z.d.). SOVON – Natuurmonitoring en advies. SOVON. Van <https://www.sovon.nl>

Vleermuis.net (z.d.). Vleermuis soorten. Van <https://vleermuis.net/>

Zoogdierenvereniging. (z.d.). Zoogdieren in Nederland. Zoogdierenvereniging. Van <https://www.zoogdierenvereniging.nl>

6. BIJLAGE I: TOETSINGSKADER SOORTENBESCHERMING

SPECIFIEKE ZORGPLICHT

In de Ow is de bescherming van alle van nature in het wild levende dieren of planten en hun directe leefomgeving opgenomen. Deze bescherming is uitgewerkt in de specifieke zorgplicht flora- en fauna-activiteiten (*paragraaf 11.22. art. 11.27 Bal*). Onder het eerste lid is bepaald dat iedereen die een flora- en fauna-activiteit uitvoert verplicht is alle maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van de activiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Als gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt moet de activiteit achterwege gelaten worden. In het tweede lid is de specifieke zorgplicht verder uitgewerkt. Hierin staat de reikwijdte van de zorgplicht beschreven. De zorgplicht heeft betrekking op de soorten die vallen onder de vogelrichtlijn (Vrl), habitatrichtlijn (Hrl) en nationaal beschermde soorten (andere soorten) maar ook planten en diersoorten op de rode lijsten. De specifieke zorgplicht geldt ook voor belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats van deze soorten. Hiervoor geldt de plicht om; onderzoek te doen naar de aanwezigheid van soorten en hun leefgebied, het nemen van passende preventieve maatregelen, het monitoren van de effectiviteit van de maatregelen en - als nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen- het staken van de activiteit of het nemen van herstelmaatregelen.

BESCHERMINGSREGIMES

De Ow kent drie categorieën soortenbeschermingsregimes voor deze regimes zijn de vergunningsplichtige gevallen en de vergunningsvrije gevallen uitgewerkt in paragraaf 11.2.2. t/m 11.2.4. van het Bal. Deze gelden voor de soorten zoals beschreven in:

- Vrl (*paragraaf 11.2.2 Bal*): vogelsoorten zoals genoemd in bijlage I van de Vrl en niet in die bijlage genoemde, geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten als bedoeld in artikel 4, 2e lid van de vogelrichtlijn.
- Hrl (*paragraaf 11.2.3. Bal*): diersoorten uit bijlage IV, onder a van de Hrl, bijlage II bij het verdrag van Bern of bijlage I bij het verdrag van Bonn en plantensoorten uit bijlage IV, onder b van de Hrl of bijlage I bij het verdrag van Bern.
- Andere soorten (*paragraaf 11.2.4. Bal*): nationaal beschermde soorten zoals genoemd in bijlage IX (Bal) A en B.

SCHADELIJKE HANDELINGEN EN VERGUNNINGSPLICHT

Onderstaand een overzicht van de schadelijke handelingen per soortenbeschermingsregime die leiden tot een vergunningsplichtig geval, vrijstellingen zijn opgenomen in de Omgevingsverordening:

Paragraaf 11.2.2. art. 11.37. Beschermingsregime Vrl soorten

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:

- a. Het opzettelijk doden of vangen van, van nature in Nederland in het wild levende vogels.
- b. Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels.
- c. Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels.
- d. Het opzettelijk storen van vogels.

Het verbod op het opzettelijk storen van vogels, geldt niet, als het storen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vogelsoort.

Paragraaf 11.2.3 art. 11.46. Beschermingsregime Hrl soorten

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:

- a. Het opzettelijk doden of vangen van dieren.
- b. Het opzettelijk verstoren van dieren.
- c. Het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren van dieren.
- d. Het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren.
- e. Het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van planten van soorten.

Paragraaf 11.2.4 art. 11.53. Beschermingsregime andere soorten

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:

- a. Het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende diersoorten.
- b. Het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren.
- c. Het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van vaatplanten.