

MEMO

Van: Roelf Pot
 Aan: Tamme Kamminga, Roy van Hezel, Gaby Krikke
 Betreft: Inspectieronde Paterswoldsemeer 10-6-2024
 Datum: 16-6-2024

Op 10 juni hebben we (Roy, ik) een inspectieronde gemaakt over het Paterswoldsemeer om te zien hoe ver de waterplanten in hun groei zijn gevorderd. Dit met het oog op de planning van maaiwerk om overlast te voorkomen.

We hebben de ondiepe delen van het meer onderzocht en met name de delen waar op basis van de ervaring van voorgaande jaren de meeste waterplanten waren te verwachten.

Algemeen

De situatie lijkt niet veel anders dan voorafgaande twee jaren. Doorgroeid fonteinkruid is de meest aangetroffen soort, gevolgd door Schedefonteinkruid en Smalle waterpest. Daarnaast werden Gekroesd fonteinkruid en enkele andere smalbladige fonteinkruiden gevonden.

Er is geen Waterwaaier gevonden in de vaarweg naar Eelderwolde. De waterplantenbegroeiing daar bestond vooral uit Drijvend fonteinkruid en Grote egelskop en beperkte zich tot een smalle strook langs de oevers. Nabij de sluis kwamen ook ondergedoken soorten voor over iets grotere breedte.

Er was in luwe delen al een begin van een bloei te zien van de blauwalg *Aphanizomenon flos-aquae* (ziet eruit als ca. 1cm lange zwevende grauwigroene draadjes).

Op onderstaande kaart is aangegeven waar is gevaren, waar de meeste waterplanten zijn aangetroffen en waar het risico op overlast het grootst wordt ingeschat. In de tekst hierna wordt naar nummers op de kaart verwezen.

Over de gevonden soorten:

Doorgroeid fonteinkruid.

Groeit dicht langs de oever (maximaal 5 tot 10 meter uit de kant) op plekken met harde bodem. Veelal in vlekken van zo'n 5 tot 20 meter doorsnee. Dit zijn uitgegroeide primaire vestigingen: de plant heeft zich een paar jaar geleden gevestigd en breidt zich jaarlijks uit door middel van wortelstokkengroei tot maximaal een meter per jaar. Op de grintbodem langs de kaden in de noordwest-hoek (1) is de dichtheid groter dan gemiddeld en zijn de meeste vlekken aan elkaar gegroeid. De begroeiing is maximaal 5 meter breed en lijkt zich vooralsnog niet naar dieper water uit te breiden. Het risico op overlast is hier gering, afgezien van lokale hinder bij steigers en langs de kade bij aan- en afmeren.

Aan de oostelijke oever (3) en langs het land ten noorden van de Oude Badweg (5) komen verspreid ook vlekken met deze soort voor.

Schedefonteinkruid.

Op een aantal plekken in de westelijke helft van de inhammen bij de Oude Badweg (6). De planten groeien in die inhammen in plukken over de gehele breedte. In relatief hoge dichtheid in een strook van ca. 5 m breed langs de oevers van de baaien aangegeven met nummer (7 en 9)

Andere fonteinkruiden.

Op een flink aantal plekken komt ook Gekroesd fonteinkruid in hogere dichtheid voor dan in eerdere jaren, meestal samen met andere fonteinkruiden. Dit is met name het geval in de smallere inhammen




bij de Oude Badweg (6a) en de inhammen bij de Meerweg (10). In deze wateren komen daarnaast ook andere soorten voor. De gemengde waterbegroeiing is daar al vrij dicht en zal spoedig tot klachten leiden.

Smalle waterpest.

Nog maar heel weinig van gevonden. Minder nog dan vorig jaar en dan voornamelijk in de noordoost hoek (2). De planten zijn nog vrijwel in winterrust, maar kunnen na opwarming van het water zeer snel uitgroeien. Tussen de eilanden lijken de planten geheel verdwenen.

Conclusie

Er is ten opzichte van 2023 niet zo veel veranderd in de begroeiing. De fonteinkruiden namen iets toe en de waterpest nam nog verder af. Risico op spoedige overlast lijkt er voorlopig eigenlijk alleen in de westelijke kreken te zijn. Mogelijk ontwikkelt zich ook weer een waterpest-veld in de noordoostelijke hoek.



Blauwe lijn: vaarroute, kaartbasis: OpenSteeMap ®